

Ambito Territoriale di Caccia - Viterbo2

MODALITA' DI PRELIEVO E CONSEGNA DEI CAMPIONI SULLE SPECIE CACCIATE

L'ATC Vt2 al fine di uniformarsi alle normative vigenti, che prevedono l'esame trichinoscopico obbligatorio per tutti i cinghiali cacciati, anche per quelli utilizzati in autoconsumo, ha deciso di riprendere tale controllo e di renderlo gratuito e fruibile anche per i cacciatori che effettuano la caccia in selezione alla specie cinghiale.

A tal fine si ricorda che per poter effettuare l'esame a tutti i cinghiali consegnati al centro di controllo verrà prelevato un campione di diaframma/lingua che sarà inviato presso l'istituto Zooprofilattico di Viterbo (I.z.s.).

- **Modalità di prelievo.** Il prelievo consiste nel tagliare preferibilmente un pezzo di diaframma o lingua, contrassegnarlo col numero di fascetta con il quale il cinghiale è stato marcato (in tale maniera si mantiene la linea di tracciabilità necessaria in caso di esiti positivi).

Per quanto relativo alle quantità di diaframma da prelevare si prega di usare le indicazioni di seguito riportate

Cinghiale	Diaframma / Lingua	Tra 50 e 80 gr
il peso riportato è da riferirsi al solo muscolo striato, in quanto per la corretta esecuzione dell'esame il campione deve essere esente da tessuto connettivo e grasso.		

- **Si suggerisce** di confezionare quanto prelevato in un sacchetto doppio in modo da evitare eventuali fuoriuscite di liquidi.
- **Informativa risultati su campioni** Il tempo che potrebbe intercorrere tra consegna dei campioni e la notifica dei risultati dovrebbe variare tra i 20 e i 30 gg.
- **Sarà obbligo** da parte dell'I.Z.S. e dell'ATC Vt2 avvertire tempestivamente il cacciatore in caso di risultato di campioni positivi. Qualora, passato tale tempo, il cacciatore non dovesse ricevere alcuna informazione, potrà considerare negativo l'esito dell'esame.
- **Norme per il consumo** Se il cacciatore volesse consumare prima del tempo la carne dell'animale abbattuto, consideri che eventuali larve di Trichinella vengono completamente distrutte previa cottura a 70 c° al cuore del pezzo per alcuni minuti (metodo certo) oppure il congelamento per almeno 4 settimane a circa -20 c° garantirebbe un'inattivazione delle larve (**metodo efficace ma che non garantisce il completo risultato**). In tal senso la carne macellata dovrebbe essere stipata in congelatore evitando di mischiare parti derivanti da diversi capi nello stesso pacchetto e che gli stessi siano contrassegnati con il numero della relativa fascetta per un più rapido controllo.
- **Si ricorda** che la carne consumata cruda o gli insaccati preparati con carne cruda sono sempre a rischio se non trattati con i metodi sopra indicati.
- **Costo** Il costo dell'esame frutto di accordi tramite l'I.Z.S. è completamente a carico dell'ATC Vt2.

Per eventuali chiarimenti in proposito potete contattare

Il Dr. Giuseppe Catalini Veterinario Consulente dell'ATC Vt2 al n° 338 6116903

Oppure i servizi Veterinari di Zona contattando il centralino al n° 0761 / 3391